



World PI Week


Test. Diagnose. Treat.

Primaarse immuunpuudulikkuse (PID) korral esineb kaasasündinud geneetilise defekti tõttu mõne immuunsüsteemi osa puudulikkus või funktsiooni häire. PID võib avalduda sageli „tavalise” infektsioonina, mistõttu infektsioone ravides võib mõnikord jääda tegelik põhjus tähelepanuta ning seetõttu kalduvad infektsioonid korduma. Korduvad infektsioonid võivad omakorda põhjustada elutähtsate organite kahjustusi, invaliidistumist ning halvemal juhul isegi surma.

22.–29. aprill



Teada on ligi 250 erinevat PID vormi



1 inimesel 1200st esineb geneetiliselt määratud PID, mis oluliselt kahjustab nende tervist



70–90% PID patsientidest jääb diagnoosimata

6 miljonil inimesel ülemaailmselt võib esineda PID



50+ ülemaailmselt on loodud üle 50 patsiendi organisatsiooni



Immuunpuudulikkuse nädalat tähistatakse igal aastal 22.–29. aprillil



10 ohumärki
PID õigeaegne diagnoosimine sõltub teadlikkusest, 10 PID ohumärki on tõlgitud 45 keelde



PID nädala eesmärgiks on teadlikkuse suurendamine ning selleks ühendavad oma jõud nii patsiendid, vanemad, hooldajad, arstid, õed kui ka poliitikud

Vaata lisaks:
www.worldpiweek.org



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

